

ゼローダ錠 300について

ゼローダ錠（XELODA）について

商品名：ゼローダ錠 300

成分名：カペシタピン



ゼローダの内服開始にあたって

ゼローダは、がん細胞を減らしたり、増殖を抑えたりする薬（抗がん剤）です。

今後服用を継続していく上で、この薬で出やすい副作用を理解しておくことは非常に大切です。

薬のことをよく理解し、上手に付き合っていきましょう。

何か異常を感じた際は我慢したり、ご自分の判断で中止したりせず、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

がん細胞に対するゼローダのはたらき

ゼローダはがん細胞に作用し、その増殖を抑えます。

ゼローダは体内に吸収されると、肝臓やがん細胞にある酵素で代謝され、5-FU（ファイブ・エフ・ユー）という物質になり抗がん作用を発揮します。

ゼローダのみで治療が行われることもありますが、他の注射抗がん剤と併せて治療に用いられることがあります。

代表的なものとして、胃癌に対するXP療法、大腸癌や胃癌に対するCapeOX療法；カペオックス療法（XELOX療法；ゼロックス療法ともいう）があります。治療内容については当院薬剤部窓口、及び薬剤部ホームページより確認可能です。

服用上の注意

・基本的に食後に内服する薬です。食後30分を目安にお飲みください（医師の指示通り）。

・毎日大体同じ時刻に内服してください。

・飲み忘れた場合はその分はとばし、次回1回分を内服してください。決して2回分を一度に飲まないでください。

副作用

副作用は恐れるのではなく、理解を深めて、うまくコントロールすることが一番大切です！

比較的発現しやすい副作用

【手足症候群】… 手足がはれる、ひび割れする、水ぶくれができる

・保湿クリームをやさしく塗り、乾燥を防ぎましょう。市販のものでも構いません。

・足に負担がかかると症状が出やすいので、靴は柔らかい素材で窮屈でないスニーカーなどを履きましょう。

・皿洗いや洗濯をする際は、洗剤などの化学物質との接触を避けるため、ゴム手袋を着用しましょう。

【悪心、食欲不振】… 胃がムカムカ力するような感覚食欲が落ちることがあります。

・無理に食事をする必要はありません。食べられない期間が続くようであればご連絡ください。

【下痢】

下痢がひどい時は脱水を避けるため、水分を多めに摂りましょう。症状によっては下痢止めを内服します。

【骨髄抑制】… 血液を作る骨髄の機能が低下することで、白血球、赤血球、血小板の数が減る

白血球や赤血球、血小板が大幅に減少した場合、発熱、息切れがしたり疲れやすくなったりといった貧血症状、血が止まりにくいなどといった症状が現れることがあります。そのため、定期的に採血を行い血液の状態を確認していきます。感染予防のため、日頃から手洗いやうがいを積極的に行ってください。

その他

・口内炎、嘔気、倦怠感など

保管上の注意

・直射日光を避け、室温で保管してください。

・妊婦が誤って飲むと胎児に奇形が生じる恐れがあります。

他の人が誤って飲むことがないよう、注意してください。

ご不明な点につきましては御気軽にお尋ねください。わたしたちがサポートします。

静岡市立清水病院 薬剤部 電話番号 054-336-1111（代表）