

# オダイン錠（フルタミド錠）について

## □ オダイン錠（Odyne tablets）

商品名：オダイン錠 125 ※ 後発品へ変更となった場合は、薬剤名が変わるがあります。

成分名：フルタミド（Flutamide）



## □ オダインの内服開始にあたって

オダインは、ホルモン療法剤と呼ばれる抗がん剤です。

副作用の出方や程度は人それぞれですが、この薬で出やすい副作用を理解しておくことは今後の生活において非常に大切です。薬のことをよく理解し、上手に付き合ってください。

何か異常を感じた際は我慢せず、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

## □ がん細胞に対するオダインのはたらき

男性ホルモンの“アンドロゲン”ががん細胞にはたらくことで前立腺がんが増殖します。

オダインは、がん細胞へのアンドロゲンの働きを妨げることで前立腺がんの増殖を抑える薬です。

## □ 服用上の注意

- ・毎日大体同じ時刻に内服してください（医師の指示通り）。
- ・飲み忘れた場合はその分はとばし、次回1回分を内服してください。決して2回分を一度に飲まないでください。

## □ 副作用とその対策

副作用は恐れるのではなく、理解を深めて、うまくコントロールすることが一番大切です！

あまり出ることはないが、特に注意が必要なもの

生命に関わる副作用なので、異常を感じたら放置せず、速やかにご連絡・受診をしてください。

【**劇症肝炎**】薬の内服に伴う肝臓の急激な炎症

初期症状として、食欲不振や悪心・嘔吐、全身のだるさ、皮膚の痒みや発疹、白目や皮膚が黄色くなる（黄疸）等があります。採血による肝機能の確認も行っていきますので、ご安心ください。

【**間質性肺炎**】薬の内服に関連した肺炎

ひどい息切れ、呼吸のしにくさ、咳、発熱などが現れたときには急性肺障害、間質性肺炎の可能性がります。

## その他の副作用

- ・ほてり（特に飲みはじめに多い）、女性化乳房（乳房が張った感じがする）、食欲不振、倦怠感、下痢など

## □ 保管上の注意

- ・直射日光を避け、室温で保管してください。
- ・妊婦が誤って飲むと胎児に奇形が生じる恐れがあります。
- 他の人が誤って飲むことがないように、注意してください。

ご不明な点につきましては御気軽にお尋ねください。わたしたちがサポートします。

静岡市立清水病院 薬剤部 電話番号 054 - 336 - 1111（代表）

《 医療機関の方々へ がん薬物療法に関するご説明・同意取得済みです 》

