

ネクサバル について

ネクサバル錠 (Nexavar tablets)

商品名：ネクサバル錠 200mg

成分名：ソラフェニブトシル酸塩 (Sorafenib Tosilate)



ネクサバルの内服開始にあたって

ネクサバルは、抗がん剤です。

今後治療を継続していく上で、この薬で発現しやすい副作用を理解しておくことは非常に大切なことです。

薬の事をよく理解し、上手に付き合ってください。

何か異常を感じた際は我慢したり、ご自分の判断で中止したりせず、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

がん細胞に対するネクサバルのはたらき

がん細胞は、細胞増殖を促す信号が過剰に伝達されることで、異常に増殖します。また、がん細胞が増殖し続けるためには血管から酸素や栄養素を取り込む必要があり、がん細胞は周囲に新たな血管を作ろうとします。

ネクサバルはその信号の伝達を妨げたり、がん細胞にとって重要な血管が作られるのを阻止したりすることで、がん細胞の増殖を抑える薬です。

服用上の注意

- ・毎日大体同じ時刻に内服してください（医師の指示通り）。
- ・高脂肪食の場合は、食事の1時間前～食後2時間の服用は避ける必要があります。フライドチキンやとんかつ、かき揚げなどの揚げ物は脂肪分が多く、またバターやマヨネーズなども脂肪分を多く含んでいるため、薬を飲む前後に摂取するのは避けるのが良いかもしれません（薬の服用前後で無ければ問題ありません）。
- ・飲み忘れた場合は、決して2回分を一度に飲まないでください。

副作用 副作用は恐れるのではなく、理解を深めて、うまくコントロールすることが大切です

比較的発現しやすい副作用

【手足症候群】… 手足がはれる、ひび割れする、水ぶくれができる

荷重がかかる部位に発現しやすいので、靴はスニーカーなどを履き、足に負担がかからないようにしましょう。また保湿クリームなどをやさしく塗り、皮膚の乾燥を防ぎましょう。症状が強い場合には塗り薬を塗っていきます。

【下痢】

下痢がひどい時は脱水を避けるため、水分を多めに摂りましょう。症状によっては下痢止めを内服します。

【高血圧】… 血圧が普段より高くなる、めまいがする

薬を飲んでいくうちに、血圧が高くなることがあります。

ご自宅で毎日血圧測定を行いその値を記録しておき、変化があれば診察の際主治医にみせるのが良いでしょう。

状態によっては血圧を下げる薬を内服していきます。

その他

- ・脱毛、下痢、食欲不振、嘔気、倦怠感 など

保管上の注意

- ・直射日光を避け、室温で保管してください。
- ・妊婦が誤って飲むと胎児に奇形が生じる恐れがあります。他の人が誤って飲むことがないように、注意してください。

ご不明な点につきましては御気軽にお尋ねください。わたしたちがサポートします。

静岡市立清水病院 薬剤部 電話番号 054 - 336 - 1111 (代表)

