

スーテントカプセルについて

スーテントカプセル (Sutent capsules) について

商品名：スーテント カプセル 12.5

成分名：スニチニプリンゴ酸塩 (Sunitinib Malate)



□ スーテントの内服開始にあたって

スーテントは、がん細胞を減らしたり、増殖を抑えたりする薬（抗がん剤）です。

今後服用を継続していく上で、この薬で出やすい副作用を理解しておくことは非常に大切です。

薬のことをよく理解し、上手に付き合ってください。

何か異常を感じた際は我慢したり、ご自分の判断で中止したりせず、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

□ がん細胞に対するスーテントのはたらき

がん細胞に、がん細胞の増殖を促す信号が過剰に伝達されることで、異常な増殖が起こります。がん細胞が増殖し続けるためには血管から酸素や栄養素を取り込む必要があり、がん細胞は周囲に新たな血管を作ろうとします。

スーテントはその信号の伝達を妨げたり、がん細胞にとって重要な血管が作られるのを阻止したりすることで、がん細胞の増殖を抑える薬です。

□ 服用上の注意

・毎日大体同じ時刻に内服してください。

・飲み忘れた場合はその分はとばし、次回 1 回分を内服してください。決して 2 回分を一度に飲まないでください。

□ 副作用

副作用は恐れるのではなく、理解を深めて、うまくコントロールすることが一番大切です！

比較的発現しやすい副作用

【 **手足症候群** 】… 手足がはれる、ひび割れする、水ぶくれができる

・日頃から保湿クリームをやさしく塗り、乾燥を防ぎましょう。市販のものでも構いません。

・足に負担がかかると症状が出やすいので、靴は柔らかい素材で窮屈でないスニーカーなどを履きましょう。

・血洗いや洗濯をする際は、洗剤などの化学物質との接触を避けるため、ゴム手袋を着用しましょう。

【 **血圧の上昇** 】… 治療前より 20mmHg 以上高くなる

内服開始後まもなく血圧が普段よりも高くなる場合があります。場合によっては血圧を下げる薬を内服します。

【 **下痢** 】

下痢がひどい時は脱水を避けるため、水分を多めに摂りましょう。症状によっては下痢止めを内服します。

その他

・脱毛、下痢、食欲不振、嘔気、倦怠感 など

□ 保管上の注意

・直射日光を避け、室温で保管してください。

・妊婦が誤って飲むと胎児に奇形が生じる恐れがあります。

他の人が誤って飲むことがないように、注意してください。

ご不明な点につきましては御気軽にお尋ねください。わたしたちがサポートします。

静岡市立清水病院 薬剤部 電話番号 054 - 336 - 1111 (代表)

《 医療機関の方々へ がん化学療法に関する説明・同意取得済みです 》

