


エンドキサン錠 50mg について

□ エンドキサン錠 (Endoxan tablets)

商品名：エンドキサン錠 50mg

成分名：シクロホスファミド水和物 (Cyclophosphamide Hydrates)



□ エンドキサンの内服開始にあたって

エンドキサンは、がん細胞を減らしたり、その増殖を抑えたりする薬（抗がん剤）です。今後服用を継続していく上でこの薬で出やすい副作用を理解しておくことは非常に大切なことです。薬の事をよく理解し、上手に付き合ってください。

何か異常を感じた際は我慢したりご自分の判断で中止したりせず、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

□ がん細胞に対するエンドキサンのはたらき

エンドキサンはがん細胞に直接作用することで、がん細胞を減らします。

□ 服用上の注意

- ・毎日大体同じ時刻に内服してください（医師の指示通り）。
- ・飲み忘れた場合はその分はとばし、次回 1 回分を内服してください。決して 2 回分を一度に飲まないでください。

□ 副作用とその対策 副作用に関する理解を深めて、うまくコントロールすることが大切です

あまり出ることはないが、特に注意が必要なもの

【 出血性膀胱炎 】

エンドキサンの代謝物の影響により、排尿時に痛みが出たり、尿に血が混じって赤くなったりする可能性があります。水分を多めに摂り尿をこまめに出すことで、その副作用のリスクは下がります。

比較の出やすいもの

症状が出たら、主治医に伝えてください。

【 骨髄抑制 】 … 血液を作る骨髄の機能が低下することで、白血球、赤血球、血小板の数が減る

白血球や赤血球、血小板が大幅に減少した場合、発熱、息切れがしたり疲れやすくなったりといった貧血症状、血が止まりにくいなどといった症状が現れることがあります。そのため、定期的に採血を行い血液の状態を確認していきます。感染予防のため、日頃から手洗いやうがいを積極的に行ってください。

【 脱毛 】

脱毛がおきるがありますが、治療が終わればまた生えてきます。

その他

- ・発疹、息苦しさ、息切れ、咳 など

□ 保管上の注意

- ・直射日光を避け、室温で保管してください。
- ・妊婦が誤って飲むと胎児に奇形が生じる恐れがあります。他の人が誤って飲むことがないように、注意してください。

ご不明な点につきましては御気軽にお尋ねください。わたしたちがサポートします。

静岡市立清水病院 薬剤部 電話番号 054 - 336 - 1111 (代表)

《 医療機関の方々へ がん薬物療法に関するご説明・同意取得済みです 》

