

# タイケルブ錠について

## □ タイケルブ錠 (Tykerb tablets)

商品名：タイケルブ錠 250mg

成分名：ラパチニブトシル酸塩水和物 (Lapatinib Tosilate Hydrate)



## □ タイケルブの内服開始にあたって

タイケルブは、ゼローダとあわせて内服することで、乳がん細胞の増殖をより効率的に抑える薬です。

今後服用を継続していく上で、このお薬で出やすい副作用を理解しておくことは非常に大切です。薬の事をよく理解し、上手に付き合っていきましょう。

何か異常を感じた際は我慢したり、ご自分の判断で中止したりせず、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

## □ がん細胞に対するタイケルブのはたらき

がん細胞は、がん細胞の増殖を促す信号により増殖します。また、がん細胞が増殖し続けるためには血管から酸素や栄養素を取り込む必要があり、がん細胞は周囲に新たな血管を作ろうとします。

タイケルブはがん細胞にその信号が伝達されるのを阻止したり、がん細胞にとって重要な血管が作られないようにしたりすることで、がん細胞の増殖を抑える薬です。

## □ 服用上の注意

- ・毎日大体同じ時刻に内服してください（医師の指示通り）。
- ・飲み忘れた場合は、決して2回分を一度に飲まないでください。

## □ 副作用とその対策

**副作用は恐れるのではなく、理解を深めてうまくコントロールすることが一番大切です！**

### 比較的に出やすいもの

症状が出たら、主治医に伝えてください。

### 【 発疹等の皮膚の異常 】 …発疹、痒み、皮膚乾燥

薬の内服を開始したら発疹を予防するため、保湿クリーム等を塗り皮膚の乾燥を防いでいきます。保湿クリームは市販のものでも構いません。

洗剤で手が荒れないよう、皿洗いをする時などは手袋を装着しましょう。

足に負担がかからないよう、窮屈な靴をはかないようにする等の対応も必要です。

### 【 吐き気・嘔吐 】

症状によっては、吐き気止めを飲み症状を緩和します。吐き気がある時は無理に食事をとる必要はありません。

### 【 下痢 】

薬を飲み始めてから比較的早い時期（6～8日くらい）に出ることが多い副作用です。

症状が出た場合には、脱水を避けるため水分を多めにとりましょう。場合によっては下痢止めのお薬を飲み、症状を緩和します。

### その他

- ・ゼローダによる血小板減少（血がとまりにくくなる）、好中球減少（熱がでやすくなる）の増強など

## □ 保管上の注意

- ・直射日光を避け、室温で保管してください。
- ・妊婦が誤って飲むと胎児に奇形が生じる恐れがあります。
- 他の人が誤って飲むことがないよう、注意してください。

ご不明な点につきましては御気軽にお尋ねください。わたしたちがサポートします。

静岡市立清水病院 薬剤部 電話番号 054 - 336 - 1111（代表）

《 医療機関の方々へ がん薬物療法に関するご説明・同意取得済みです 》

