ブレオS軟膏について

□ ブレオS軟膏(Bleo-S)

商品名;ブレオS軟膏

成分名: ブレオマイシン(Bleomycin)

□ ブレオS軟膏の内服開始にあたって

ブレオS軟膏は、がん細胞の増殖を抑える薬です。

今後使用を継続していく上で、このお薬で出やすい副作用を理解しておくことは非常に大切なことです。

お薬のことをよく理解し、上手に付き合っていきましょう。

何か異常を感じた際は我慢したり、ご自分の判断で中止したりせず、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

□ がん細胞に対するブレオS軟膏のはたらき

ブレオSはがん細胞に直接作用し、その増殖を抑えます。

□ 服用上の注意

- 毎日大体同じ時刻に内服してください(医師の指示通り)。
- ・飲み忘れた場合はその分はとばし、次回1回分を内服してください。決して2回分を一度に飲まないでください。

□ 副作用とその対策

副作用は恐れるのではなく、理解を深めて、うまくコントロールすることが一番大切です!

比較的出現しやすい副作用

軟膏を塗布している部位に、痛みが出ることがあります。痛みが強くなる場合には、主治医にご相談ください。軽度 の痛みであれば使用を継続しますが、痛みが増強する場合には他の薬剤へ変更したり、使用を中止したりする必要が あります。

その他の副作用

軟膏を塗布している部分に発赤や炎症、色素沈着が起こることがあります。

□ 保管上の注意

- ・直射日光を避け、室温で保管してください。
- 妊婦が誤って飲むと胎児に奇形が生じる恐れがあります。

他の人が誤って飲むことがないよう、注意してください。

ご不明な点につきましては御気軽にお尋ねください。わたしたちがサポートします。

静岡市立清水病院 薬剤部 電話番号 054 - 336 - 1111(代表)



