

インライタ錠について

□ インライタ錠 (Inlyta tablets)

商品名：インライタ錠 1mg, 5mg 修復

成分名：アキシチニブ (Axitinib)



1mg

5mg

□ インライタの内服開始にあたって

インライタはがん細胞を減らしたり、その増殖を抑えたりする薬（抗がん剤）です。

今後治療を継続していく上で、この薬で出やすい副作用を理解しておくことは非常に大切です。

薬のことをよく理解し、上手に付き合ってください。

何か異常を感じた際は我慢したり、ご自分の判断で中止したりせず、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

□ がん細胞に対するインライタのはたらき

体内でがん細胞が増え続けるためには酸素や栄養が必要なので、がん細胞はそれらを効率よく得るための新たな血管を作り出す力を持っています。

インライタはがん細胞にとって大切な血管が作られるのを阻止するなどして、がん細胞の増殖を抑える薬です。

□ 服用上の注意

- ・毎日大体同じ時刻に内服してください（医師の指示通り）。
- ・飲み忘れた場合は、決して2回分を一度に飲まないでください。
- ・健康食品として売られているセント・ジョーンズ・ワート（セイヨウオトギリソウ）含有食品と一緒に飲むと、この薬の効果が弱くなる可能性があります。
- ・グレープフルーツジュースを飲むと、薬による副作用が出やすくなる可能性があります。

□ 副作用とその対策 副作用に関する理解を深めて、うまくコントロールしていくことが大切です

比較的出やすいもの 症状が出たら主治医に伝えてください

【 下痢 】

飲み始めてから一ヶ月以内に出ることが多い副作用です。

下痢の症状が続く場合は、水分を多めにとって脱水を防ぎましょう。

症状によっては、下痢止めを内服する場合があります。

【 高血圧 】… 血圧が普段より高くなる、めまいがする

薬を飲んでいくうちに、血圧が高くなる場合があります。

ご自宅で毎日血圧測定を行いその値を記録しておき、大きな変化があれば診察の際主治医にみせるのが良いでしょう。

必要に応じて、血圧を下げる薬を内服します。

【 手足症候群 】… 手のひらや足底が痛む・赤く腫れあがる・皮膚がむける

荷重がかかる部位に出やすいので、靴はスニーカーなどを履き、足に負担がかからないようにしましょう。また保湿クリームなどをやさしく塗り、皮膚の乾燥を防ぎましょう。症状が強い場合は塗り薬を塗っていきます。

その他

- ・倦怠感、食欲不振、発声障害（しゃべりにくい、声が変わる） など

□ 保管上の注意

- ・直射日光を避け、室温で保管してください。
- ・妊婦が誤って飲むと胎児に奇形が生じる恐れがあります。
- 他の人が誤って飲むことがないように、注意してください。

ご不明な点につきましては御気軽にお尋ねください。わたしたちがサポートします。

静岡市立清水病院 薬剤部 電話番号 054 - 336 - 1111 (代表)

《 医療機関の方々へ がん薬物療法に関するご説明・同意取得済みです 》

