

がん腫 泌尿器癌 膀胱癌 / 尿路上皮癌

レジメン GEM + CDDP + RT 療法

レジメン内容	用量	点滴時間	Day1
CDDP	30mg/m ²	60分	↑
GEM	300mg/m ²	30分	↑
RT			↑

1クールの間 1週間

《新規》注射 未実施 泌尿器 医師名なし

- Rp01 2019/01/23 ~ 2019/01/23 毎日 - (1)
 - メインルートキープ
 - メイン点滴 末梢①
 - 点滴(メイン、自然滴下)
 - 生食 250ml 1 本
- Rp02 2019/01/23 ~ 2019/01/23 毎日 - (1)
 - メイン開始後、側管より
 - 側管点滴 末梢①
 - 点滴(側管、自然滴下)
 - 15分かけて注入
 - 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 8 ml
 - 生食 50ml 1 本
- Rp03 2019/01/23 ~ 2019/01/23 毎日 - (1)
 - 側管点滴 末梢①
 - 点滴(側管、自然滴下)
 - 15分かけて注入
 - アロキシン静注0.75mg/5ml 1 瓶
 - デキサート注射液6.6mg/2mL 9.9 mg
 - 生食 50ml 1 本
- Rp04 2019/01/23 ~ 2019/01/23 毎日 - (1)
 - RT増感 CDDP 原法 30mg/m²
 - 側管点滴 末梢①
 - 点滴(側管、自然滴下)
 - 60分かけて注入
 - シスプラチン点滴静注液10mg「ファイザー」 20ml 1 mg
 - シスプラチン点滴静注液50mg「ファイザー」 100ml 1 mg
 - 生食 250ml 1 本
- Rp05 2019/01/23 ~ 2019/01/23 毎日 - (1)
 - RT増感 GEM 原法 300mg/m²
 - 側管点滴 末梢①
 - 点滴(側管、自然滴下)
 - 30分かけて注入
 - 点滴時間厳守!
 - ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」★ 1 mg
 - ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」★ 1 mg
 - 生食 100ml 1 本

レジメンについて

主なエビデンス

開始基準

減量基準

主な副作用 (%)

当院レジメンについて ✓

患者への注意事項 ✓

参考資料 ✓